

同意書

イソトレチノインはビタミン A 誘導体の「レチノイド」と呼ばれるグループに属する難治性のニキビの治療に使用される飲み薬です。

皮脂腺を退縮させることにより皮脂分泌を抑え、アクネ菌を減らし、炎症を抑えて毛穴のつまりを改善します。

●治療期間:

- ・1～3ヶ月を1クールとし、次の1～3か月間は休薬期間とします。
- ・肝機能異常や脂質異常などの副作用が起こりえるため、治療前、1ヵ月内服後に自費にて血液検査が必要となります。

●内服方法:

- ・1日 1回 食後のタイミングに服用します

●副作用とリスク:

- ・皮膚・粘膜→表皮がはがれ、薄くなる 口唇、口腔、鼻、眼および皮膚が荒れる 鼻出血、脱毛
- ・肝障害→だるさ 食欲不振 白目や肌が黄色っぽくなる 吐き気
- ・頭蓋内圧→嘔吐 頭痛 目のかすみ
- ・うつ症状
- ・乾燥による口角炎、口唇炎、鼻出血、ドライアイ
- ・肝機能障害、脂質異常
- ・膵炎、肝炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、アナフィラキシーショック、スティーブンス・ジョンソン症候群、自殺企図
- ・胎児の催奇形性（内服中、内服中止後6ヶ月間は必ず避妊）

●服用中、服用後の注意:

- ・服用開始後、1ヵ月間は一過性のニキビの増悪がみられることがあります。
- ・妊娠していないことを確認の上、服用を開始してください
- ・服用開始前に必ず授乳を中止し、服用中も授乳はしないでください

●以下に当てはまる方はイソトレチノインによるニキビ治療を受けることができない場合があります

- ・18歳未満の方
- ・精神疾患を患っている方
- ・潰瘍性大腸炎、クローン病、重篤な肝障害などの既往がある方
- ・イソトレチノイン製剤でアレルギーを起こしたことのある方、アスピリン喘息のある方、
- ・レーシック手術を受けて半年以内の方
- ・レーザー脱毛、光脱毛を行っている方（服用中、服用中止後1ヵ月は脱毛を中断していただく必要があるため）
- ・妊娠中、授乳中、妊娠中、1年以内に妊娠の予定のある方
- ・ビタミンAを含むサプリメントを飲んでいる方
- ・ビタミンA過敏症の方、ビタミンA配合化粧品などでアレルギーを起こしたことのある方

※治療の効果には個人差があります

私は、上記の説明を受け内容を理解し、イソトレチノイン内服の治療を受けることに同意します

年 月 日

氏 名:

(未成年の場合)

保護者氏名:



マイ形成外科スキンクリニック

お問い合わせ: 047-411-4417